


Moniato

Ipomoea batatas

Convolvulàcies



^{ES} Boniato ^{EN} Sweet potato ^{IT} Patata dolce
^{FR} Patate douce

Moniato ^{CA} Moniatera, Batata, Patata de Màlaga ^{ES}
Batata, Chaco, Papa dulce, Patata dulce, Papa
camote, C... ^{EN} Sweetpotato ^{IT} Batata, Patata americana, Kumara ^{FR}
Patate sucrée, Patate ^{ZH} 番薯 (fān shǔ)



Aprofitament: tubercle i full

Sembra a collita: 4-5 mesos

Exposició solar: ple sol (resistent a la calor) - mín. 6h+

Consum d'aigua: moderat (resistent a la sequera)

Res. plagues: moderada

Res. Gelades: baixa

Època de sembra: abril - juny 20-30 °C

Preparació de la terra: terra solta, ben drenada i rica en mat. orgànica; pH 5,5 y 7,5

Dist. planta x filera: 30-40 x 75-90 cm

Profunditat sembra: 5-10 (o enterrant 2-3 nus) cm

Temp. germinació: MÍNIMS 15 °C ÓPTIMS 20-25 °C MÀXIMS 30 °C

Temps germinació: 15 dies (esqueix)

Trasplantament/notes: 2-6 setmanes / 10-20 cm (esqueix)

Recol·lecció: 90-150 dies (setembre - octubre)

Bona associació: Lleguminoses (Pèsol, Fava, mongetes de mata baixa), Blat de moro, Enciam, Espinac, Julivert, Farigola, Orenga - *Herbes aromàtiques repelleixen insectes no desitjats, Cultius de cicle ràpid*

Mala associació: Solanàcies (Tomàquet, Albergínia, Patata), Gira-sol, Carabassa, Meló - *Plantes de fulla gran o molt altes (planta que li faci ombra)*

Cultivar / varietat, data de collita i notes