

Col xinesa

Brassica rapa subsp. *pekinensis*

Brassicàcies (Crucíferes)



ES Col China *EN* Napa cabbage *IT* Cavolo di
Pechino *FR* Chou chinois

Col xinesa

^{CA} Col pequinesa, Col napa, Col-api ^{ES}
Repollo chino, Hakusai, Akusay, Pechay
^{EN} Chinese cabbage, Celery cab... ^{IT} Cavolo cinese, pe tsai, cavolo napa
^{FR} Pé-tsaï, Bai cai, Chou de Pék... ^{ZH} 大白菜 (dà bái cài)



Aprofitament: full

Sembra a collita: 60-90 dies

Exposició solar: ple sol o semisombra - mín. 4-6h+

Consum d'aigua: moderat

Res. plagues: baixa

Res. Gelades: moderada

Època de sembra: juliol-agost (tardor) o febrer-març (pri.) 13-22 °C

Preparació de la terra: terra rica, fèrtil, ben drenada; pH 6,5-7

Dist. planta x filera: 40 x 30 cm

Profunditat sembra: 0,5 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 15 °C MÀXIMS 30 °C

Temps germinació: 5-8 dies

Trasplantament/notes: sembra directa o planter (4-6 setmanes)

Recol·lecció: octubre-novembre (tardor) / abril-maig (primavera)

Bona associació: Api, Espinac, Enciam, Rave, Tomàquet, Pastanaga - *Api i espinac repellen plagues de brassicàcies; enciam i rave aprofiten espais sense competir; tomàquet i pastanaga complementen el cultiu*

Mala associació: Col, Coliflor, Nap, Bròquil - *Mateixa família (brassicàcies): competeixen pels mateixos nutrients i comparteixen plagues i malalties (oruges, mosca, Alternària)*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes