

Mongeta

Phaseolus vulgaris

Fabàcies (Lleguminoses)



^{ES} Judía ^{EN} Common bean ^{IT} Fagiolo
^{FR} Haricot

Mongeta ^{CA} Fesol, Fesols ^{EN} Green bean, French bean, Runner bean ^{IT} Fagiolino ^{FR} Haricot
commun ^{ZH} 菜豆 (cài dòu), 四季豆 (sì jì dòu)



Y1 Aprofitament: llavor

🕒 Sembra a collita: 60-90 dies

☀️ Exposició solar: ple sol - mín. 6h+

💧 Consum d'aigua: 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ moderat

🐛 Res. plagues: 🌿 🌿 🌿 🌿 baixa (pugons, àcars)

❄️ Res. Gelades: ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ molt baixa (no aguanta cap gelada)

📅 Època de sembra: abril - juliol 🌡️ 18-28 °C

🌱 Preparació de la terra: terra rica, ben drenada; pH 6-7

📏 Dist. planta × filera: 60 × 50 cm

📏 Profunditat sembra: 3-5 cm

🌱 Temp. germinació: MÍNIMS 2 °C ÒPTIMS 20 °C MÀXIMS 30 °C

⌚ Temps germinació: 5-10 dies

🌱 Trasplantament/notes: sembra de seient (o directa)

🍷 Recol·lecció: 90-100 dies

☺️ **Bona associació:** Alfàbrega, Bleda, Api, Albergínia, Carabassó, Carabassa, Col, Espinac, Maduixera, Enciam, Nap, Patata, Cogombre, Pebrotera, Rave, Tomàquet, Pastanaga - La mongeta fixa nitrogen beneficiant gran varietat d'hortalisses; alfàbrega repella insectes; cultius de fruit i arrel aprofiten el nitrogen fixat

☹️ **Mala associació:** All, Ceba, Pèsol, Fava, Fonoll, Porro, Remolatxa - Alliums inhibeixen la fixació de nitrogen; pèsol i fava competeixen per espai i nutrients; fonoll és al·lelopàtic i inhibeix la mongeta; remolatxa s'inhibeixen mútuament

Cultivar / varietat, data de collita i notes