

Blat de moro

Zea mays

Poàcies (Gramínies)



ES **Maíz**

EN **Corn**

IT **Mais**

FR **Maïs**

Blat de moro

玉米 (yù mǐ)

^{CA} Dacsa ^{EN} Maize, Sweet corn ^{IT}
Granoturco ^{FR} Blé de Turquie ^{ZH}



Aprofitament: llavor

Sembra a collita: 80-100 dies

Exposició solar: ple sol - mín. 6h+

Consum d'aigua: moderat (necessita reg regular)

Res. plagues: moderada

Res. Gelades: molt baixa (la plàntula és molt sensible)

Època de sembra: abril - juny 18-30 °C

Preparació de la terra: terra profunda, rica en mat. orgànica, ben drenada; pH 5,8-7

Dist. planta x filera: 20-30 x 70-80 cm

Profunditat sembra: 4 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 10 °C ÒPTIMS 25 °C MÀXIMS 35 °C

Temps germinació: 5-10 dies

Trasplantament/notes: sembra directa en blocs (millor pol·linització creuada)

Recol·lecció: agost-octubre

Bona associació: Cacauet, Pèsol, Fava, Mongeta, Moniato, Alfàbrega - 'Tres Germanes' clàssiques: lleguminoses fixen nitrogen, moniato cobreix el sòl; alfàbrega repella insectes; sistema de cultiu complementari tradicional

Mala associació: Patata, Meló - Patata i blat de moro competeixen per nitrogen i espai; meló pot competir per l'espai i la llum en créixer

Cultivar / varietat, data de sembra i notes