

Meló

Cucumis melo

Cucurbitàcies



ES **Melón** *EN* **Melon** *IT* **Melone** *FR* **Melon**

Meló

^{CA} Meloner ^{EN} Muskmelon, Cantaloupe ^{ZH} 甜瓜 (tián guā), 哈密瓜 (hā mì guā)



Aprofitament: fruit

Sembra a collita: 90-120 dies

Exposició solar: ple sol (mínim 8 hores/dia) - mín. 6-8h+

Consum d'aigua: moderat (reduir reg prop de la maduresa)

Res. plagues: baixa (oïdi, pugons, mosca blanca)

Res. Gelades: molt baixa

Època de sembra: abril - maig 20-30 °C

Preparació de la terra: terra rica, ben drenada; pH 6-7

Dist. planta x filera: 100 x 50 cm

Profunditat sembra: 1-2 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 12 °C ÒPTIMS 26 °C MÀXIMS 35 °C

Temps germinació: 3-7 dies

Trasplantament/notes: sembra de seient (o directa)

Recol·lecció: 120 dies

Bona associació: Ceba, Pèsol, Enciam - Pèsol fixa nitrogen beneficiant el meló; ceba repel·la pugons; enciam cobreix el sòl entre les plantes de meló i reté la humitat

Mala associació: Meló, Cogombre, Síndria - Cucurbitàcies (cogombre, síndria) i mateixa espècie: comparteixen plagues i malalties; plantes de la mateixa espècie poden causar pollinització creuada indesitjada

Cultivar / varietat, data de sembra i notes