


Nap

Brassica rapa subsp. *rapa*

Brassicàcies (Crucíferes)



ES Nabo

EN Turnip

IT Rapa

FR Navet

Nap

^{CA} Grumoll ^{IT} Navone ^{ZH} 茺菁 (wú jīng)



Aprofitament: arrel

Sembra a collita: 50-70 dies

Exposició solar: ple sol o semisombra lleugera - mín. 4-6h+

Consum d'aigua: baix-moderat

Res. plagues: moderada

Res. Gelades: alta

Època de sembra: març - octubre 8-18 °C

Preparació de la terra: terra profunda, lleugera, ben drenada; pH 6-7

Dist. planta x filera: 15 x 15 cm

Profunditat sembra: 0,5-1 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 20 °C MÀXIMS 30 °C

Temps germinació: 3-6 dies

Trasplantament/notes: sembra de seient (o directa)

Recol·lecció: 60 dies

Bona associació: Col, Espinac, Pèsol, Mongeta, Enciam, Cogombre, Porro, Remolatxa, Tomàquet - *Lleguminoses fixen nitrogen; cultiu de cicle curt que aprofita espais; les hortalisses de fruit no competeixen pels mateixos nutrients que el nap*

Mala associació: Rave, Pastanaga - *Rave i nap (mateixa família brassicàcia) comparteixen plagues (Alties, mosca); pastanaga pot inhibir el nap per competència d'arrels en profunditat*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes