

Rocoto

Capsicum pubescens

Solanàcies



ES **Rocoto**

EN **Rocoto**

IT **Rocoto**

FR **Rocoto**

Rocoto

^{CA} Locoto ^{ES} Locoto, Chile manzano ^{EN} Locoto ^{IT}
Locoto ^{FR} Locoto ^{ZH} 紫花椒 (zǐ huā jiāo)



Aprofitament: fruit

Sembra a collita: 180-240 dies

Exposició solar: ple sol o semisombra lleugera - mín. 4-6h+

Consum d'aigua: moderat

Res. plagues: moderada (general)

Res. Gelades: moderada (esp. d'alt, aguanta temp. més baixes)

Època de sembra: febrer-març 15-25 °C

Preparació de la terra: terra ben drenada, rica en matèria orgànica; pH 6-7

Dist. planta x filera: 60 x 60 cm

Profunditat sembra: 0,5 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 18 °C ÒPTIMS 25 °C MÀXIMS 35 °C

Temps germinació: 14-21 dies

Trasplantament/notes: planter interior 10-12 setmanes (germinació delicada)

Recol·lecció: setembre-novembre (1r any) / tot l'any (planta perenne en cl.)

Bona associació: Api, Espinac, Alfàbrega, Farigola, Sàlvia - *Alfàbrega, farigola i sàlvia repellen insectes nocius i atreu pollinitzadors; espinac i api cobreixen el sòl i complementen els nutrients del rocoto*

Mala associació: Patata, Tomàquet, Cogombre - *Solanàcies (patata, tomàquet) comparteixen plagues i malalties; cogombre pot competir per espai i pollinitzadors*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes