

Rocoto

Capsicum pubescens
Solanàcies



ES Rocoto EN Rocoto IT Rocoto FR Rocoto

Rocoto

CA Locoto ES Locoto, Chile manzano EN Locoto IT
Locoto FR Locoto ZH 紫花椒 (zǐ huā jiāo)



🍴 Aprofitament: fruit

🕒 Sembra a collita: 180-240 dies

☀️ Exposició solar: ple sol o semisombra lleugera - mín. 4-6h+

💧 Consum d'aigua: 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ moderat

🐛 Res. plagues: 🐛 🐛 🐛 🐛 moderada (general)

❄️ Res. Gelades: ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ moderada (esp. d'alt, aguanta temp. més baixes)

📅 Època de sembra: febrer-març 🌡️ 15-25 °C

🌱 Preparació de la terra: terra ben drenada, rica en matèria orgànica; pH 6-7

📏 Dist. planta x filera: 60 x 60 cm

📏 Profunditat sembra: 0,5 cm

🌱 Temp. germinació: MÍNIMS 18 °C ÒPTIMS 25 °C MÀXIMS 35 °C

🕒 Temps germinació: 14-21 dies

🌱 Trasplantament/notes: planter interior 10-12 setmanes (germinació delicada)

🍷 Recol·lecció: setembre-novembre (1r any) / tot l'any (planta perenne en cl...)

😊 Bona associació: Api, Espinac, Alfàbrega, Farigola, Sàlvia - Alfàbrega, farigola i sàlvia repellen insectes nocius i atreu pollinitzadors; espinac i api cobreixen el sòl i completen els nutrients del rocoto

😞 Mala associació: Patata, Tomàquet, Cogombre - Solanàcies (patata, tomàquet) comparteixen plagues i malalties; cogombre pot competir per espai i pollinitzadors

Cultivar / varietat, data de collita i notes