

Remolatxa

Beta vulgaris subsp. *vulgaris* var. Gp Conditiva

Amarantàcies subfam. *Quenopodiàcies*



ES Remolacha *EN* Beetroot *IT* Barbabietola
rossa *FR* Betterave

Remolatxa

^{ZH}甜菜 (Tián cài)

^{CA} Bleda-rave ^{EN} Beet, Red beet ^{IT}
^{Bietola da radice} ^{FR} Betterave rouge



Aprofitament: arrel, full i pecíol

Sembra a collita: 70-90 dies

Exposició solar: ple sol o semisombra lleugera - mín. 4-6h+

Consum d'aigua: baix-moderat

Res. plagues: moderada

Res. Gelades: moderada (aguanta lleus gelades)

Època de sembra: març - juny 10-22 °C

Preparació de la terra: terra profunda, solta, ben drenada; pH 6-7

Dist. planta x filera: 30 x 20 cm

Profunditat sembra: 2 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 18 °C MÀXIMS 30 °C

Temps germinació: 10-14 dies

Trasplantament/notes: sembra de seient (o directa)

Recol·lecció: 90 dies

Bona associació: Api, All, Ceba, Col, Enciam, Nap, Cogombre, Porro - *Alliums repel·len plagues; remolatxa aporta minerals al sòl a través de les fulles caigudes; la majoria de veïns no competeixen pels mateixos nutrients*

Mala associació: Mongeta, Tomàquet, Pastanaga - *Mongeta i remolatxa s'inhibeixen mútuament; tomàquet i pastanaga competeixen per espai i nutrients similars a la remolatxa*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes