

Remolatxa

Beta vulgaris subsp. *vulgaris* var. Gp Conditiva

Amarantàcies subfam. Quenopodiàcies



^{ES} Remolacha ^{EN} Beetroot ^{IT} Barbabietola
rossa ^{FR} Betterave

Remolatxa

^{CA} Bleda-rave ^{EN} Beet, Red beet ^{IT} Bietola da radice ^{FR} Betterave rouge

^{ZH} 甜菜 (Tián cài)



🌿 **Aprofitament:** arrel, full i pecíol

🕒 **Sembra a collita:** 70-90 dies

☀️ **Exposició solar:** ple sol o semisombra lleugera - mín. 4-6h+

☂️ **Consum d'aigua:** 💧💧💧💧 baix-moderat

🐛 **Res. plagues:** 🐛🐛🐛🐛 moderada

❄️ **Res. Gelades:** ❄️❄️❄️❄️ moderada (aguanta lleus gelades)

📅 **Època de sembra:** març - juny 🌡️ 10-22 °C

🏡 **Preparació de la terra:** terra profunda, solta, ben drenada; pH 6-7

📏 **Dist. planta × filera:** 30 × 20 cm

📏 **Profunditat sembra:** 2 cm

🌱 **Temp. germinació:** MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 18 °C MÀXIMS 30 °C

⌚ **Temps germinació:** 10-14 dies

🌱 **Trasplantament/notes:** sembra de seient (o directa)

🍷 **Recol·lecció:** 90 dies

😊 **Bona associació:** Api, All, Ceba, Col, Enciam, Nap, Cogombre, Porro - *Alliums* repel·len plagues; remolatxa aporta minerals al sòl a través de les fulles caigudes; la majoria de veïns no competeixen pels mateixos nutrients

😞 **Mala associació:** Mongeta, Tomàquet, Pastanaga - *Mongeta* i remolatxa s'inhibeixen mútuament; tomàquet i pastanaga competeixen per espai i nutrients similars a la remolatxa

Cultivar / varietat, data de collita i notes