


Síndria

Citrullus lanatus

Cucurbitàcies



ES Sandía *EN* Watermelon *IT* Anguria
FR Pastèque

Síndria ^{CA} Sandiera ^{IT} Cocomero ^{ZH} 西瓜 (xī guā)



Aprofitament: fruit

Sembra a collita: 90-120 dies

Exposició solar: ple sol - mín. 6-8h+

Consum d'aigua: baix-moderat (resistent a la sequera)

Res. plagues: baixa (sensible a oïdi, antracnosi)

Res. Gelades: molt baixa

Època de sembra: abril - maig 22-32 °C

Preparació de la terra: terra sorrenca, ben drenada, rica en mat. orgànica; pH 6-7

Dist. planta x filera: 100 x 50 cm

Profunditat sembra: 2-3 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 13 °C ÒPTIMS 25 °C MÀXIMS 35 °C

Temps germinació: 6-8 dies

Trasplantament/notes: sembra de seient (o directa)

Recol·lecció: 120 dies

Bona associació: Ceba, Pèsol, Enciam - Pèsol fixa nitrogen; ceba repel·la pugons i àcars; enciam cobreix el sòl entre les plantes de síndria i reté la humitat

Mala associació: Meló, Cogombre - Cucurbitàcies (meló, cogombre): mateixa família, comparteixen plagues i malalties (oïdi, antracnosi) i pollinitzadors

Cultivar / varietat, data de collita i notes