


Pastanaga

Daucus carota subsp. *sativus*

Apiàcies (Umbel·líferes)



ES **Zanahoria**

EN **Carrot**

IT **Carota**

FR **Carotte**

Pastanaga

^{CA} Safanòria, Carrota, Carlota ^{ES}
Carrota, Carlota, Pastinaca, Bufanagas
^{ZH} 胡萝卜 (hú luó bo)



Aprofitament: arrel i full

Sembra a collita: 90-120 dies

Exposició solar: ple sol o semisombra lleugera - mín. 4-6h+

Consum d'aigua: baix

Res. plagues: moderada (mosca de la pastanaga)

Res. Gelades: moderada (aguanta lleus gelades)

Època de sembra: març - octubre 10-22 °C

Preparació de la terra: terra profunda, solta, llimosa, ben drenada; pH 6-7

Dist. planta x filera: 20 x 5 cm

Profunditat sembra: 1-2 cm

Temp. germinació: MÍNIMS 6 °C ÒPTIMS 18 °C MÀXIMS 30 °C

Temps germinació: 12-15 dies

Trasplantament/notes: sembra de seient (o directa)

Recol·lecció: 120 dies

Bona associació: Bleda, All, Albergínia, Ceba, Col, Pèsol, Mongeta, Enciam, Patata, Porro, Rave - *Alliums repellen la mosca de la pastanaga; porro i pastanaga es protegeixen mútuament de les seves respectives mosques (associació clàssica); lleguminoses fixen nitrogen*

Mala associació: Api, Remolatxa - *Api i pastanaga (mateixa família Apiàcies) comparteixen la mosca de la pastanaga (Psila rosae) i nematodes; remolatxa competeix per espai i pot inhibir la pastanaga*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes