


Pastanaga

Daucus carota subsp. *sativus*

Apiàcies (Umbel·líferes)



^{ES} Zanahoria ^{EN} Carrot ^{IT} Carota
^{FR} Carotte

Pastanaga

^{CA} Safanòria, Carrota, Carlota ^{ES}
Carrota, Carlota, Pastinaca, Bufanagas
^{ZH} 胡萝卜 (hú luó bo)



🌱 Aprofitament: arrel i full

🕒 Sembra a collita: 90-120 dies

☀️ Exposició solar: ple sol o semisombra lleugera - mín. 4-6h+

💧 Consum d'aigua: 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ baix

🦋 Res. plagues: 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 moderada (mosca de la pastanaga)

❄️ Res. Gelades: ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ moderada (aguanta lleus gelades)

📅 Època de sembra: març - octubre 🌡️ 10-22 °C

🌱 Preparació de la terra: terra profunda, solta, llimosa, ben drenada; pH 6-7

📏 Dist. planta x filera: 20 x 5 cm

📏 Profunditat sembra: 1-2 cm

🌡️ 🌱 Temp. germinació: MÍNIMS 6 °C ÒPTIMS 18 °C MÀXIMS 30 °C

⌚ 🌱 Temps germinació: 12-15 dies

🌱 Trasplantament/notes: sembra de seient (o directa)

🌱 Recol·lecció: 120 dies

😊 **Bona associació:** Bleda, All, Albergínia, Ceba, Col, Pèsol, Mongeta, Enciam, Patata, Porro, Rave - *Alliums* repellen la mosca de la pastanaga; porro i pastanaga es protegeixen mútuament de les seves respectives mosques (associació clàssica); lleguminoses fixen nitrogen

😞 **Mala associació:** Api, Remolatxa - *Api* i *pastanaga* (mateixa família Apiàcies) comparteixen la mosca de la pastanaga (*Psila rosae*) i nematodes; remolatxa competeix per espai i pot inhibir la pastanaga

Cultivar / varietat, data de collita i notes