

# Col llombarda

*Brassica oleracea* var. *capitata* f. *rubra*

*Brassicàcies (Crucíferes)*



*ES* **Lombarda**    *EN* **Red cabbage**

*IT* **Cavolo rosso**    *FR* **Chou rouge**

# Col llombarda

col morada o berza morada <sup>CA</sup> Col morada <sup>ES</sup> Col lombarda, repollo morado, <sup>IT</sup> Cavolo viola, Verza viola <sup>ZH</sup> 紫甘藍 (zǐ gān lán)



**Aprofitament:** full

**Sembra a collita:** 90-120 dies

**Exposició solar:** ple sol - mín. 6h+

**Consum d'aigua:** moderat

**Res. plagues:** baixa

**Res. Gelades:** alta

**Època de sembra:** abril-juny 10-20 °C

**Preparació de la terra:** terra rica, fèrtil, ben drenada; pH 6,5-7,5

**Dist. planta x filera:** 60 x 50 cm

**Profunditat sembra:** 0,5 cm

**Temp. germinació:** MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 15 °C MÀXIMS 30 °C

**Temps germinació:** 5-8 dies

**Trasplantament/notes:** planter 4-6 setmanes / trasplantar juny-agost

**Recol·lecció:** octubre-desembre

**Bona associació:** Api, Pèsol, Mongeta, Enciam, Patata, Cogombre, Porro, Remolatxa, Tomàquet - *Alliums i api repel·len plagues de brassicàcies; lleguminoses fixen nitrogen; enciam i espinac cobreixen el sòl entre les plantes de col llombarda*

**Mala associació:** All, Ceba, Maduixera, Fonoll, Rave - *All i ceba inhibeixen el creixement de la col llombarda; fonoll és al·lelopàtic amb les brassicàcies; rave (brassicàcia) comparteix plagues; maduixera competeix per espai*

Cultivar / varietat, data de sembra i notes