

Col llombarda

Brassica oleracea var. *capitata* f. *rubra*

Brassicàcies (Crucíferes)



^{ES} Lombarda ^{EN} Red cabbage

^{IT} Cavolo rosso ^{FR} Chou rouge

Col llombarda ^{CA} Col morada ^{ES} Col lombarda, repollo morado,

col morada o berza morada ^{IT} Cavolo viola, Verza viola ^{ZH} 紫甘藍 (zǐ gān lán)



🌱 Aprofitament: full

🕒 Sembra a collita: 90-120 dies

☀️ Exposició solar: ple sol - mín. 6h+

💧 Consum d'aigua: 🌧️ 🌧️ 🌧️ 🌧️ moderat

🐛 Res. plagues: 🌿 🌿 🌿 🌿 baixa

❄️ Res. Gelades: ❄️ ❄️ ❄️ ❄️ alta

📅 Època de sembra: abril-juny 🌡️ 10-20 °C

🌱 Preparació de la terra: terra rica, fèrtil, ben drenada; pH 6,5-7,5

📏 Dist. planta × filera: 60 × 50 cm

📏 Profunditat sembra: 0,5 cm

🌱 Temp. germinació: MÍNIMS 5 °C ÒPTIMS 15 °C MÀXIMS 30 °C

🕒 Temps germinació: 5-8 dies

🌱 Trasplantament/notes: planter 4-6 setmanes / trasplantar juny-agost

🍷 Recol·lecció: octubre-desembre

😊 **Bona associació:** Api, Pèsol, Mongeta, Enciam, Patata, Cogombre, Porro, Remolatxa, Tomàquet - *Alliums* i *api* repellen plagues de brassicàcies; *lleguminoses* fixen nitrogen; enciam i espinac cobreixen el sòl entre les plantes de col llombarda

😞 **Mala associació:** All, Ceba, Maduixera, Fonoll, Rave - *All* i *ceba* inhibeixen el creixement de la col llombarda; *fonoll* és allelopàtic amb les brassicàcies; *rave* (brassicàcia) comparteix plagues; *maduixera* competeix per espai

Cultivar / varietat, data de collita i notes